立即查治小菜蛾

小菜蛾俗称“吊死鬼”，是一种全球迁飞性害虫。春季虫源大量上升，主要源自我国南方迁入。主要危害大白菜、甘蓝、菜花、白萝卜、油菜等十字花科蔬菜，以幼虫危害寄主叶片，1-2 龄低龄幼虫仅取食叶肉，留下表皮，形成透明斑，俗称“开天窗”，3 龄后食量增大，取食造成孔洞和缺刻，严重时全叶被吃成网状。在苗期常集中为害心叶，影响包心。

小菜蛾成虫交配后 1-2 天开始产卵，产卵期可持续 1-2 周。卵期一般为 3-7 天，温度在 25℃左右时，卵期约 4-5 天。近期气温适宜，有降雨过程，对小菜蛾成虫活动、交尾、产卵有利。预计小菜蛾 5 月上中旬陆续出现幼虫危害，应根据蔬菜种植情况，密切监测害虫的发生动态，及时进行田间防治。防治技术建议:

1、杀虫灯诱杀成虫:小菜蛾成虫有趋光性，有条件的地方可在成虫发生期进行灯光诱杀。

2、性信息素诱杀成虫:亩设诱捕器 3 个，利用性信息素诱杀小菜蛾雄虫。

3、科学用药:抓住防治适期，掌握在卵孵化盛期和 1-2 龄幼虫期用药，可选用苏云金杆菌、甘蓝夜蛾核型多角体病毒、苦参碱、甲胺基阿维菌素苯甲酸盐、高效氯氟氰菊酯等喷雾防治。喷药时要注意喷均打透,化学药剂要轮换使用，避免产生抗药性。严格按标签标注用药，注意施药安全间隔期。

(根据《中华人民共和国生物安全法》《农作物病虫害防治条例》《农作物病虫害监测与预报管理办法》等法律规章规定:任何单位和个人转载农作物病虫害预报的，应当注明发布机构和发布时间，不得更改预报。)